

Yu Borneo muncul semula

BH 30.03.2007 P. 3

Oleh Mohd Izham Unnip

KOTA KINABALU: Saintis Institut Penyelidikan Marin Borneo (IPMB) Universiti Malaysia Sabah (UMS) menemui semula spesies yu Borneo yang dikatakan 'hilang' di perairan Sabah dan Sarawak 148 tahun lalu.

Spesies itu, *Carcharhinus borneensis* pertama kali ditemui seorang pengkaji marin Belanda, Dr Pieter Bleeker, pada 1859 tetapi dianggap pupus kerana tidak menemuinya selepas itu.

Pengarah IPMB, Prof Dr Saleem Mustafa, berkata saintis IPMB yang melakukan kajian sumber perikanan pesisir pantai Sabah dan Sarawak sejak 2000 itu mengesan semula kehadiran spesies itu, baru-baru ini. Ia kini disenaraikan antara spesies terancam.

Selain spesies yu, saintis IPMB menemui dua spesies baru pari pesisir pantai dan air payau di perairan Sarawak, tahun lalu.

Katanya, spesies pertama dikenali pari mulut lohong (*Himantura lobistoma*) manakala yang kedua dikenali pari muncung kasar (*Pastinachus solocirostris*).

Selain itu, Dr Saleem berkata, saintis IPMB menemui satu spesies baru



PENTING: Kemunculan yu Borneo memberi harapan pemulihan spesies ini.

FAKTA NOMBOR

Spesies Yu Borneo

1895

Tahun mula ditemui

2007

Tahun ditemui semula

400

Pelbagai spesies direkodkan

ketam dikenali 'ketam bakau Likas' di kawasan hutan simpanan paya bakau, kira-kira 2 kilometer dari sini.

Beliau berkata, tiga penemuan itu menambahkan lagi koleksi spesies baru direkodkan di Kepulauan Borneo yang kini dianggarkan berjumlah lebih 400 spesies.

Ini termasuk 37 spesies ikan air tawar dan lima spesies ketam. Sepanjang 2005, enam spesies ikan termasuk ikan kedua terkecil di dunia sepanjang kira-kira 8 milimeter direkodkan di Borneo.

Beliau berkata, ia hasil kerjasama penyelidikan dengan beberapa organisasi antarabangsa seperti Penyelidikan Marin Pertubuhan Penyelidikan Saintifik dan Industri Commonwealth (CSIRO) di Australia, Universiti Tasmania dan Universiti Kebangsaan Singapura.